
Nota al editor

En referencia a los datos aportados en la Sección Historia Clínica publicados en la Revista N° 249 Vol 55 de este año 2013, es necesario considerar que actualmente se están reportando casos de piomiositis con mayor frecuencia en nuestro Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez". Esto puede ser explicado, en parte, por ser éste un hospital de referencia, aunque probablemente se correlacione con la tendencia en aumento de la incidencia del *Staphylococcus aureus* (SA), el germen implicado con más frecuencia en el desarrollo de piomiositis.

En el hospital se realizó el seguimiento prospectivo de pacientes internados por infecciones estafilocócicas durante 12 meses, período octubre 2010 a septiembre 2011 (datos presentados en el Simposio de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica 2012). En comunicación con uno de los autores (M. Laura Praino), surge que en dicho trabajo se

identificaron 176 episodios de infecciones de origen en la comunidad. Se evidenciaron 15 (8,5%) pacientes con piomiositis (5 con cuadro de presentación multifocal y 10 unifocales). El 20% (3/15) de los pacientes presentaron hemocultivos positivos. Ninguno de los pacientes presentaba enfermedades de base ni antecedentes de infecciones a repetición en piel.

No se cuenta con los datos de los pacientes ambulatorios con piomiositis ni están incluidos en este estudio los episodios con otros aislamientos microbiológicos o sin rescate de germen.

La piomiositis es una infección que está siendo reportada con más frecuencia en la actualidad en pacientes sin factores de riesgo. Por lo tanto, debe ser tenida en cuenta entre los diagnósticos diferenciales dada la potencial gravedad que implica dicha patología.