

## Campaña de Vacunación de Seguimiento Sarampión, Rubéola, Polio

A partir del día 1° de Septiembre y hasta el 31 de Octubre de este año se desarrollará la **Campaña de Vacunación de Seguimiento contra Sarampión, Rubéola y Poliomiélitis para la población de 1 a 4 años.**

**Propósito:** Consolidar la eliminación de sarampión, rubéola, SRC y poliomiélitis en Argentina.

**Objetivos:** Superar el 95% de cobertura con una **dosis extra** de vacuna antipoliomielítica OPV/Sabin o IPV/Salk y doble/triple viral (SR/SRP) en el 100% de provincias, municipios y departamentos de Argentina en niños entre 1 a 4 años.

### INDICACIONES:

Población	Vacuna
Niños de 12 a 13 meses	<b>SRP y Sabin</b> ▷ Citar para administrar <b>SR</b> con un intervalo mínimo de 4 semanas.
Niños de 13 meses a 23 meses 29 días con CNV completo	<b>SR y Sabin</b>
Niños de 13 meses a 23 meses 29 días con CNV incompleto o con una dosis previa de SR o esquema incompleto de OPV	<b>SRP y Sabin</b> ▷ Si CNV incompleto: Citar para administrar <b>SR y/o OPV</b> respetando intervalos mínimos según vacuna y dosis. ▷ Si había recibido SR en lugar de SRP (previa a la campaña): No volver a citar.
Niños de 24 meses a 4 años 11 meses 29 días con CNV completo	<b>SR y Sabin</b>
Niños de 24 meses a 4 años 11 meses 29 días (con CNV incompleto o con una dosis previa de SR)	<b>SRP y Sabin</b>
Los niños vacunados con IPV/Salk EXCLUSIVAMENTE y con esquema completo, deberán recibir la dosis extra de la campaña como vacuna OPV/Sabin. Para la dosis extra de OPV/Sabin no es necesario respetar ningún intervalo mínimo con la IPV/Salk, pudiendo administrarse en la misma oportunidad.	

### INDICACIONES EN INMUNOCOMPROMETIDO Y SUS CONVIVIENTES:

Población	Vacuna
Niños <b>CON</b> inmunocompromiso <sup>(1)</sup> :	<b>Salk (IPV)</b> y con indicación medica <sup>(2)</sup> : administrar <b>SR o SRP</b>
Niños <b>CONVIVIENTES</b> con personas inmunocomprometidas <sup>(1)</sup> :	<b>Salk (IPV)</b> y <b>SR o SRP</b>
(1) Inmunocompromiso: inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, inmunosupresión por drogas, trasplantados órganos sólidos o precursores hematopoyéticos, enfermedad oncológica (2) NO debe aplicarse triple viral/doble viral en caso de: inmunodeficiencia grave, enfermedades oncohematológicas, inmunodeficiencia congénita, tratamiento inmunosupresor, infección por VIH/SIDA sintomática grave y/o con CD4 < 15%	

**Fuente:** Lineamientos de la Campana Nacional de Vacunación Contra Sarampión, Rubéola y Poliomiélitis para niños de 1 a 4 años.