

¿Cuál es su diagnóstico? Pregunta

What is your diagnosis? Question

PABLO G. DEI-CAS^a; CECILIA P. PATIÑO^a; FLORENCIA A. LOPERFIDO^a;
ANA CLARA VULCANO^a; MATIAS E. GUNTHER^a

Paciente de sexo masculino de 1 mes y 11 días de vida, procedente del sur del conurbano bonaerense, NT(40 semanas), APEG (4.200 kg), Apgar 8/10, producto de un embarazo controlado, con serologías maternas negativas y vacunas completas para la edad, que consulta al Servicio de Emergencias de nuestro Hospital por presentar rechazo del alimento, asociado a único registro febril (39,5°C). Se realiza examen físico sin datos positivos a destacar, por lo que se decide su internación en la Sala de Pediatría, con diagnóstico de "lactante febril sin foco".

El laboratorio de ingreso informa: hemograma: glóbulos blancos: 15.700 /mm³ (neutrófilos 43%, linfocitos 35%), hemoglobina 12 g/dl, hematocrito 35%, plaquetas 357.000 mm³, ERS 63 mm/hr, PCR 4.5 mg/dl. Sedimento urinario: 0-2 leucocitos x campo. Rx de tórax normal. Se toman hemocultivos y urocultivo. La punción lumbar informa la presencia de 2 células/mm³ (linfocitos). Se toma conducta expectante por presentar resultados de laboratorio de bajo riesgo.

Durante su primer día de internación el niño persiste con registros febriles por lo que, por grupo etario, se decide medicar con ceftriaxona a 100 mg/kg/día.

Al día siguiente se evidencia eritema en el ángulo interno del ojo izquierdo, que progresa en pocas horas, agregándose edema bpalpebral y protrusión del globo ocular, con motilidad del mismo conservada (*Fotografía 1*).

Fotografía 1.



¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?

- Conjuntivitis.
- Celulitis periorbitaria.
- Histiocitosis de células de Langerhans.
- Etmoiditis complicada con celulitis orbitaria.
- Rabdomiosarcoma.
- Metástasis de neuroblastoma.

a. Servicio de Pediatría. Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón de Avellaneda.

Correspondencia: pediatriaperon@gmail.com

Conflicto de interés: ninguno que declarar.